Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

5-FU (Adrucil, Efudex, 5 Fluorouricil)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente.

- **Boca Adolorida** – Puede ocurrir 5-8 dias despues de recibir esta droga. Su boca puede ponerse roja y adolorida o ulceras blancas pueden aparecer en los labios, lengua, o dentro de la boca.
- **Diarrea -** Puede que aumenten las veces que tiene que ir al baño y su excremento puede estar más suelto o aguado. Se le puede dar medicacion para controlar esto. Por lo regular no hay calambres cuando hay diarrea.
- **Náusea y vómito** – Le darán medicina para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Recuento globular bajo** – Esto es temporal y puede ocurrir 7-14 dias despues del tratamiento. Durante este tiempo, usted está más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Le analizaran su recuento globular frecuentemente.
- **Cambios de la piel** – Puede notar que las venas donde recibió la inyección se ponen más oscuras. Su piel tambien puede ser más sensible al sol y se puede requemar más facilmente. Los dedos de las manos y pies, las palmas de las manos y pies pueden ponerse rojas y se pueden pelar. Pongase crema bronceadora con filtro y ropa protectora.
- **Perdida de pelo** – Pude ocurrir pero es temporal.
- **Cambios Nasales y de los ojos** – Puede notar que sus ojos se ponen rojos o se sienten irritados. Puede que le lloren los ojos. Puede notar que le gotea la nariz. Esto despareceró cuando los tratamientos terminen.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Náusea o vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas
- Diarrea incontrolable o si tiene que ir al bano más de 4 veces al dia o si esto no es normal para usted. Si siente calambres cuando tiener diarrea.
- Dolor de cabeza, disturbio de los ojos, si su paso es inseguro
- Sangre en el excremento o en la orina
- Ulceras blancas o heridas en la boca o en la lengua
- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; areas blancas en la boca o en la lengua

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses despues del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**