Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Adriamycin (Doxorubicin)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente.

- **Recuento globular bajo** – Es temporal y ocurre normalmente de 10 a 14 dias despues del tratamiento. Durante este tiempo, usted esta más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Se pueden hacer análisis de sangre para analizar su recuento globular.
- **Náusea y vómito** – Esto puede durar por 24 horas. Se le dará medicación para ayudar a controlar o prevenir estas molestias
- **Orina rosa, roja, ó anaranjada** por 1-2 dias despues de tomar esta medicina.
- **Perdida de pelo reversible** – Casi todos los pacientes pierden todo el pelo del cuerpo. Este es un efecto secundario pasajero y ocurre de 10-14 días despues del primer tratamiento.
- **Anormalidades del ritmo del corazón y falla del corazón** son effectos relacionados con la dosis. El doctor puede evaluar su condicion cardiaca antes de empezar su primer tratamiento.
- **Herpes labiales** tal vez o tal vez no ocurran de 7-10 días despues del tratamiento. Es importante que mantenga la higiene de su boca y use cepillos de dientes suaves.
- **Fiebre** – Puede ocurrir en las primeras 24-48 horas despues de tomar la medicina.
- **Enrojecimiento temporario** de la piel en lugar donde le administren el tratamiento. Forúnculos pueden desarrollarse durante la infusion.
- **Fatiga** – Puede incluir cansancio fisico o mental (difficultad para concentrarse).

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Rojez, dolor o inflamación en la parte donde recibió la inyección
- Náusea y vómito incontrolable; inabilidad de comer o beber por mas de 24 horas
- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar; un herpe hinchado o rojo; areas blancas en la boca o en la lengua
- Sangre en el excremento u orina, moretones raros, sangre por la nariz
- Dolor de pecho, falta de aliento, inflamación de las piernas o tobillos, latido del corazó irregular o muy rápido

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses despues del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y óvulos.
- **Si la medicina se derrama afuera de la vena, puede causar dolor y dañar la piel como si fuera una quemadura seria. Digale a su doctor o enfermera INMEDIATAMENTE si siente cualquier dolor donde le ponen la inyeccion.**
- **Antes de cualquier consulta dental, digale a su dentista que está tomando esta medicina.**