Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Campath (Alemtuzumab)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Efectos secundarios con la inyección** – Pueden occurrir escalofríos, fiebre, náusea, vómito, y baja tensión. Se le administrará medicina anteriomente para tratar de evitar estos síntomas. Estos efectos son más comunes durante la primera semana de terapia y los sintomas disminuyen tan pronto como su cuerpo se acostumbre a la terapia.
- **Recuento globular bajo** – Esta droga causa que su recuento globular baje temporariamente. Durante este tiempo, usted está más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Se le harán análisis de sangre periódicamente mientras esté tomando esta droga.
- **Fatiga de energia/cansancio**
- **Sarpullido o erupción**
- **Perdida de apetito**
- **Diarrea**
- **Dolor de cabeza**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Escalofríos, fiebre, náusea, vómito, mareos, etc. durante la inyección
- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: sangrar por la nariz y que no para cuando aplica presión; sangre en la orina o en el excremento; encias que sangren; moretones raros; marcas rojas o moradas en el cuerpo; o cortaduras que no dejan de sangrar por más tiempo de lo normal.
- Fatiga extremada, falta de aliento, mareos
- Náusea o vómito que persiste o si no puede comer o beber por 24 horas
- Diarrea que persiste (si va al baño más de 4 veces en un día)

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- Haga planes para que otra persona la lleve a casa después de recibir esta droga.
- Consulte a su doctor antes de tomar otras medicinas incluyendo medicinas que no requieren receta médica.