Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

CisPlatin (Platinol, Platinol AQ, Cis Platinum)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Náusea/Vómito** – Puede ocurrir una hora despues de recibir esta droga y puede continuar por aproximadamente 4 días. Se le dará medicación para ayudar a controlar o prevenir estas molestias. ES MUY IMPORTANTE QUE TOME ESTA MEDICINA AL PIE DE LA LETRA PARA EVITAR ENFERMARSE.
- **Daño a los riñones** – Esta droga puede dañar los rinones. Por ese motivo, recibirá liquidos por via intravenosa para tratar de prevenir esto. La function de sus rinones sera evaluada por medio de exámenes de sangre y orina durante el tiempo que tome esta droga.
- **Perida de la audicion** – Puede tener un sonido de silbidos en los oidos o perdida de audicion en frequencias altas.
- **Recuento globular bajo** – Puede ocurrir 1-2 semanas despues de recibir esta droga. Durante este tiempo, usted estara más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Se pueden hacer análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
- **Daño a los nervios** – Puede sentirse entumecido o sentir una sensacion de hormigueo en los dedos de las manos y los pies. Esto es raro pero será evaluado.
- **Peridida de pelo** – Perdida leve del pelo puede ocurrir pero crece otra vez cuando el tratamiendo termina.
- **Cambios en el sentido del gusto o perdida de apetito** - Puede sentir un sabor metálico en la boca.
- **Fatiga** – Este es un síntoma secundario relacionado con el efecto de la droga en los riñones.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncologia inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Zumbidos en los oidos, si no puede oir que el refrigerador trabaja, o el canto de los pájaros.
- Si se siente entumecido o tiene sensasion de hormigueo en los dedos de las manos o pies o si tiene problemas con su cordinacion de movimientos.
- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; areas blancas en la boca o en la lengua
- Cualquier inflamación de los pies o la parte baja de las piemas o si tiene cambios en la manera que orina.
- Si el lugar donde recibió su inyección esta rojo, dolorido, o hinchado.
- Falta de aliento o si tiene problemas con su respiración.
- Sangre en la orina o en el excremento.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- **Aumente la ingestión de líquidos** – Beba 8-10 vasos de líquidos al día.