Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

**Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.**
**Para emergencias, llame al 911.**

# EDUCACION PARA PACIENTES

**Cytoxan (Cyclophosphamide)**

## EFECTOS SECUNDARIOS

**Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:**

- **Recuento globular bajo** – Es temporal y ocurre normalmente 8 -15 días después del tratamiento. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Se pueden hacer análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
- **Náusea y Vómito** – Puede empezar 3-6 horas después del tratamiento. Se le dará medicación para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Irritación de la vejiga** – Tiene que tomar por lo menos 2 ½ litros de liquidos, de preferencia aqua, el día que reciba esta droga y el dia siguiente.
- **Herpes labiales** – Pueden salir 1-2 semanas después de recibir la droga. Tal vez su boca se ponga roja o inflamada. También pueden aparecer manchas blancas o úlceras.
- **Péridada de apetito o cambios del gusto** – Tal vez la comida no sabrá bien o tal vez no tendrá ganas de comer. Si esto sucede, hable con el doctor o enfermera para que le den recomendaciones de nutrición.
- **Pérdida de pelo** – Este efecto es temporarario y empieza aproximadamente 10-21 días después del tratamiento.
- **Infertilidad** – Puede ser que su recuento de esperma (hombre) disminuya o que ocurran cambios en su ciclo menstrual (mujer) que sean permanentes. **De todas maneras, usted necesita continuar usando métodos anticonceptivos.**
- **Cambios pulmonares** - Puede notar falta de aliento más a menudo y/o tos después de haber tomado Cytoxan por un tiempo prolongado. Notifique a su médico o enfermera si tiene cualquiera de estos síntomas.

## RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Náusea o **Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:**

- Vómito que no puede controlar o si no puede comer o beber por 24 horas
- Sangre en el excremento o en la orina, moretones raros, o sangre por la nariz
- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe inchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Si siente ardor cuando orina o si parece que hay sangre en la orina; si cambia la cantidad de orina
- Herpes labiales o úlceras
- Si le cuesta trabajo respirar o si nota que tiene tos fuera de lo normal.

## INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Tome 10-12 vasos de líquidos durante los días que reciba esta droga** – Su cuerpo desecha esta droga por medio de la orina, así que es muy importante que tome muchos líquidos antes y después el tratamiento y que orine frequentemete después del tratamiento.
- **Métodos anticonecptivos** son necesarios durante y por 4 meses despues del tratamiento porque el tratamiento puede poner en peligro la salud del esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**