Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Dacarbazine (DTIC)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esta medicina puede bajarle el número de glóbulos blancos producidos para evitar infecciones y puede bajarle también el número de particulas de sangre producidas para coagular la sangre. Durante este tiempo, usted esta más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Puede ocurrir 14-28 dais despues del tratamiento.
- **Náusea y vómito** – Puede ocurrir 1-2 horas despues de que empieze el tratamiento y puede durar hasta 12 horas. Antes del tratamiento se le dará medicación para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Sabor a metal/Pérdida de apetito** – Para que sus alimentos le sepan mejor lávese la boca frequentemente antes y después de cada alimento. Trate de usar varios condimentos para ver cuales ayudan a que la comida sepa mejor.
- **Síntomas similares a esos de la gripe** – Después de varias dosis, puede que sienta como si tiene gripe – fatiga, dolor de músculos, y fiebre. Esto puede durar hasta 10 días despues del tratamiento, pero es muy raro.
- **Pérdida de pelo** – La pérdida de pelo es mínima y depende de la cantidad de droga que le den. El pelo normalmente crece otra vez después de terminar su tratamiento.
- **Ardor o dolor cerca de la vena** – esta droga puede que le cause molestias cerca de la vena en donde recibe la inyección, pero puede corregirse normalmente al diluir la droga con más líquido o si hacen que corra más despacio. Dígale a la enfermera si tiene cualquier molestia.
- **Piel sensitivea** – La piel se ponse sensitiva al sol especialmente durante los primeros 2 días de la terapia. Necesita evitar la luz del sol y siempre usar bronceador con filtro para el sol.
- **Fatiga**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; á reas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangrar por la nariz y que no para cuando aplica presión; sangre en la orina o en el excremento; encias que sangran; moretones raros; marcas rojas o moradas en el cuerpo; o cortaduras que no dejan de sangrar por más tiempo de lo normal.
- Náusea o vómito que no puede controlar o si no puede comer o beber por 24 horas
- Si el lugar donde recibió la inyección se pone rojo, hinchado, o si le causa dolor.
- Falta de aliento, mareos, o cansancio excesivo

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**