Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Daunorubicin (Daunomycin, Cerubidine)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Náusea y vómito** – Es común que ocurra 1-3 horas después del tratamiento y puede durar por 24 horas. Antes del tratamiento se le dará medicación para ayudar a controlar o prevenir estas molestias
- **Orina descolorida** – Orina puede ser rosa o roja hasta por 48 horas después de que reciba la droga.
- **Pérdida de pelo** – La pérdida completa del pelo ocurre aproximadamente 2 o más semanas después de empezar el tratamiento. El pelo normalmente crece otra vez después de terminar su tratamiento.
- **Recuento globular bajo** – Esto ocurre normalmente 1-2 semanas después del tratamiento. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Puede ocurrir 14-28 días después del tratamiento.
- **Herpes labiales** – Se pueden empeorar a medida que continua el tratamiento.
- **Daño al músculo del corazón** – Esto puede ocurrir. Normalmente se hacen estudios antes de que esta droga sea administrada, en varias ocaciones durante el tratamiento, y después de terminar el tratamiento para determinar como trabaja su corazón.
- **Sensibilidad al sol** – No se exponga al sol por largo tiempo porque su piel es más sensible al sol; se puede quemar más fácilmente. Siempre use bronceador con filtro para el sol cuando se exponga al sol.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: sangrar por la nariz y que no para cuando aplica presión; sangre en la orina o en el excremento; encías que sangran; moretones raros; marcas rojas o moradas en el cuerpo; o cortaduras que no dejan de sangrar por más tiempo de lo normal.
- Si siente que pierde el aliento o si se le inflaman los tobillos
- Náusea y vómito que no puede controlar o si no puede comer o beber por 24 horas
- Si el lugar donde recibió la inyección se pone rojo, hinchado, o dolotido.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- **Esta droga puede irritar su piel si se derrama fuera de la vena. NOTIFIQUE A SU ENFERMERA INMEDIATAMENTE SI SIENTE ARDOR, PICADURA, O DOLOR CUANDO LE ADMINISTRAN LA DROGA.**