Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Dexamethasone (Decadron)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Irritación del estómago** – Puede ser que sienta indigestión malestar, ardor, indigestión o dolor como quemazón en el estómago. Si tiene ulceras, la droga puede agravarlas. Tome su medicina con comidas para evitar estos problems.
- **Nivel de azúcar elevado en la sangre** – Esto sucede normalmene si usa la droga por largo tiempo. Necesita reportar si empieza a sentir más sed, si orina más frequentemente, si se fatiga más a menudo o se siente mareado porque estos síntomas pueden ser indicaciones de que su nivel de azúcar esta elevado o que tiene diabetes. Si es diabético, puede ser necesario que ajusten su dosis con insulina o medicaciones orales.
- **Problemas para dormir/inquietud/cambios de ánimo** – Esto es temporario y desaparecerá una vez que termine de tomar esta medicina. Si es posible, tome esta droga en la mañana para evitar problemas de insomnio.
- **Ganar peso/retener aqua** – Esta medicina puede causar que retenga agua. Puede notar que sus tobillos, pies, y manos se hinchan y que su rostro esté algo hinchado.
- **Aumento de apetito**
- **Cambios de ánimo.**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncologia inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Mareos, vista desenfocada, orina muy frequente, sed excesiva – estos son síntomas de diabetes.
- Si sus tobillos, pies, o manos están hinchados
- Sangre en el excremento o si está negro o muy obscuro
- Depresión o cambios de ánimo muy severos
- Si es diabético, tiene que informar a su enfermera o doctor ANTES de empezar esta droga.
- Si tiene úlceras en el estómago, informe a su doctor ANTES de empezar esta droga.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- Es muy importante que tome esta medicación EXACTAMENTE como se la recetan. No cambie la dosis o la hora de tomarla sin consultar a su doctor.