Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Epirubicin (Ellence)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos sí ntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esta medicina puede bajarle el número de glóbulos blancos y plaquetas de la sangre. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, hemorragias. Se pueden hacer análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
- **Náusea y vómito –** Puede ocurrir. Se le dará medicación para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Orina rosa, roja, o anaranjada –** por 1-2 días después de recibir la droga.
- **Pérdida de pelo temporaria –** Casi todos los pasientes pierden todo el pelo del cuerpo. Este síntoma es temporario y normalmente ocurre 2-3 semanas después del primer tratamiento. El pelo empieza a crecer otra vez 2-3 meses despues del primer tratamiento.
- **Anormalidad del ritmo cardíaco y falla del corazón –** Esto está relacionado con la dosis. Su doctor puede evaluar la condición de su corazón antes del primer tratamiento.
- **Herpes labiales –** Tal vez o tal vez no ocurran pocos días despues del tratamiento. Es importante que mantenga la higiene de su boca. Use cepillos de dientes suaves.
- **Fatiga –** Puede ser fatiga física o mental (puede ser dificil concentrarse)
- **Cambio de la regla –** Puede causar menopausia prematura y cambios en su regla.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Si el lugar donde recibió la inyección está rojo, inflamado, o dolorido
- Náusea y vómito descontrolado o si no puede comer o beber pr 24 horas
- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar; un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Sangre cuando mueve el vientre o cuando orina, moretones raros o si le sangra la nariz
- Dolor en el pecho, falta de aliento, hinchazón de piernas o tobillos, latido del corazón rápido o irregular
- Herpes en la boca

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses despues del tratamiento porque pueden ocurrir modificaciones en la esperma y óvulos.
- **Esta droga puede irritar su piel o dañarla como si fuera una quemadura s se derrama fuera de la vena. Notifique a su enfermera INMEDIATAMENTE si siente dolor donde le pusieron la inyección.**
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**