Marian Regional Medical Center
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH 805.481.7245. Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Etoposide (VePesid, VP-16)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esto es temporario y puede ocurrir 2-3 semanas después de tomar esta droga. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Se pueden hacer análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
- **Presión arterial baja** – Puede ocurir durante el tiempo que tome esta droga. Se le puede checar la presión arterial antes, durante, o después de la inyección de esta droga.
- **Náusea y vómito –**Normalmente es moderada; se le dará medicación para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Pérdida de pelo –** Puede ser que la cantidad del pelo le disminuya. Esto es temporario y normalmente le crecerá después de que termine el tratamiento.
- **Anormalidad del ritmo cardíaco y falla del corazón –** Esto está relacionado con la dosis. Su doctor puede evaluar la condición de su corazón antes del primer tratamiento.
- **Estreñimiento**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar; un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: sangrar por la nariz y que no para cuando aplica presión; sangre en la orina o en el excremento; encías que sangran; moretones raros; marcas rojas o moradas en el cuerpo; o cortaduras que no dejan de sangrar por más tiempo de lo normal
- Mareos; si se siente nervioso o mareado durante la inyección – **DIGALE A LA ENFERMERA INMEDIATAMENTE.**
- Náusea y vómito descontrolado o si no puede comer o beber por 24 horas
- Si tiene estreñimiento muy severo
- Si siente hormigueo, si se le duermen los dedos de las manos o pies
- Si tiente respiración ruidosa (silbido), fiebre, o escalofrios

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque puede haber modificaciones de la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, digale a su dentista que está tomando esta medicina.**