Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Flutamide (Eulexin)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Cambios temporales en su recuento globular puede causar que esté más bajo. Durante este tiempo, usted puede correr el riesgo de hemorragias o infecciones. Su doctor puede hacerle análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
- **Aumento de los senos** – Puede ser que los senos estén tiernos o más grandes. Puede ser que debido a cambios hormonales, usted sienta menos deseo sexual o impotencia
- **Náusea** – Puede ocurrir pero normalmente puede controlarse con medicación.
- **Fatiga** – Puede ser que se sienta más cansado mientras tome esta droga. Descanse más frecuentemente y notifique a su doctor si este síntoma persiste.
- **Sofoco de calor** – Esto se intensifica cuando combina esta droga con Lupron.
- **Pérdida el libido** – La pérdida del deseo sexual es peor cuando combina esta droga con Lupron.
- **Impotencia** – Peor cuando combina esta droga con Lupron.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Diarrea con calambres o inflamación que dura más de 24 horas
- Señal de hemoragia: Sangrar por la nariz y que no para cuando aplica presión; sangre en la orina o en el excremento; encías que sangran; moretones raros; manchas rojas o moradas en el cuerpo; o cortaduras que no dejan de sangrar por más tiempo de lo normal.
- Fatiga excesiva
- Hinchazón de las manos, piernas, o tobillos

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**