Si tiene alguna p
por favor consul
medico o llame a
Cancer Care de
al 805.481.7245.
Para emergencia

EDUCACION PARA PACIENTES

FUDR (Floxuridine)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Pérdida de apetito** – es normal y temporaria.
- **Diarrea** – Puede ocurrir. Pida medicina a su doctor si este síntoma le causa molestias.
- **Herpes labiales** – Puede ocurrir. Mantenga bien la higiene de su boca y dígale a su doctor si los herpes labiales no le permiten comer.
- **Náusea y Vómito –** Se le dará medicación para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Ardor de estómago o úlceras –** Se le puede dar medicina para prevenir esto.
- **Pérdida de pelo –** Es temporaria y el pelo crece otra vez.
- **Recuento globular bajo –** Esta droga puede bajarle el recuento globular y las plaquetas de la sangre. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Se pueden hacer análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
- **Sarpullido**
- **Falta de coordinación**
- **Fatiga**
- **Vista desenfocada**
- **Depresión**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Diarrea persistente
- Náusea y vómito persistente o si no puede comer por 24 horas
- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangre en la orina o deposición, sangre por la nariz, encias que sangran

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede poner en peligro la salud del esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**