Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Gemcitabine (Gemzar)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo –** Esta droga puede bajar su recuento globular. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Se pueden hacer análisis de sangre para evaluar su recuento globular
- **Náusea y Vómito** – Es común por 24-48 horas después de recibir esta droga. El uso de Tylenol ayuda a controlar la fiebre.
- **Fiebre** – Es normalmente leve y común por 24-48 horas despues de recibir la droga. Tylenol puede ayudarle a controlar la fiebre.
- **Diarrea** – Puede ocurrir pero por lo normal es leve o moderada y se puede controlar con medicina.
- **Sarpullido** – Ronchas pequeñas o ronchas levantadas y rojas pueden darle picazón. Esto sucede generalmente en el pecho, la espalda, las piemas, y los brazos.
- **Síntomas similares a los de la gripe** – Dolor de cabeza, dolor muscular, escalofrios, y falta de apetito pueden ocurrir. Esto sucede normalmente en las primeras 48 horas despues de recibir esta droga.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangrar por la nariz y que no para cuando aplica presión; sangre en la orina o en el excremento; encías que sangran; moretones raros; manchas rojas o moradas en el cuerpo; o cortaduras que no dejan de sangrar por más tiempo de lo normal.
- Cualquier señal de sarpullido
- Diarrea persistente
- Hinchazón de los pies, tobillos, o manos
- Náusea o vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses despues del tratamiento porque puede haber modificaciones de la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**