Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Hydroxyurea (Hydrea)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Su recuento globular puede bajar si toma altas dosis de esta droga. Este cambio en el recuento globular es por lo general temporario y se puede recuperar en poco tiempo. Le evaluarán su recuento globular mientras esté tomando esta droga.
- **Náusea y vómito –** Puede ocurrir si toma altas dosis. Es posible que tenga que tomar medicina para esto o tomar pocas cápsulas a la vez.
- **Cambios de la piel –** Ocasionalmente, puede salir un sarpullido rojizo. Tal vez su boca se sienta adolorida, especialmente si está recibiendo radiación.
- **Falta de apetito**
- **Pérdida de pelo** – No es común pero puede disminuir.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un resfrio, une lesión bucal que parece infectada, areas blancas en la boca o en la lengua
- Sarpullido nuevo y que le causa molestias
- Confusión, convulsiones, mareos, dolor de cabeza o alucinaciones
- Si sangra en lugares nuevos o hemorragias raras
- Si vomita la medicina o la comida
- Herpes labiales

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque puede haber modificaciones en la y los óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**