Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Idarubicin (Idamycin)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo –** Esto es temporario y ocurre por lo general 10-14 días después del tratamineto. Durante este tiempo, usted puede correr el riesgo de hemorragias o infecciones. Su doctor puede hacerle análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
- **Náusea y Vómito –** Común. Se le dará medicina para ayudar a controlar y prevenir estos síntomas. Puede durar hasta 24 horas después del tratamiento.
- **Orina, rosa, roja, o anaranjada –** Por 1-2 días después de recibir la droga.
- **Pérdida de pelo temporal –** Pérdida de pelo casi completa del cuerpo. Este síntoma es temporario. Pelo crece otra vez 2-3 meses después del último tratamiento.
- **Anormalidades del ritmo del corazón y falla del corazón –** Esto está relacionado con la dosis. Su doctor puede checar su estado cardiático antes del primer tratamiento.
- **Herpes labiales –** Tal vez o tal vez no ocurran pocos días después del tratamiento. Es importante que mantenga la higiene de su boca. Use cepillos de dientes suaves.
- **Fatiga –** Puede incluir fatiga física o mental (es dificil concentrarse).
- **Diarrea/Dolor abdominal –** Por lo general 3 de cada 4 pacientes sienten estos síntomas. Pídale medicina a su doctor para ayudarle con estas molestias.
- **La base de las uñas pierden el color.**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Enrojecimiento, dolor, o inflamación en el lugar donde recibió la inyección
- Náusea o vómito incontrolable; si o puede comer o beber por 24 horas.
- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Sangre en el excremento o en la orina; moretones raros o sangre por la nariz
- Dolor en el pecho, falta de aliento, hinchazón de las piemas o tobillos, latido del corazón irregular o rápido
- Herpes labiales
- Diarrea incontrolable

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede poner en peligro la salud del esperma y óvulos.
- **Esta droga puede irritar su piel o dañarla como si fuera una quemadura si se derrama fuera de la vena. Notifique a su enfermera INMEDIATAMENTE si siente dolor en el sitio de la inyección.**
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**