Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Ifosfamide (Ifex)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Irritación de la vejiga –** Esta medicina puede irritar el forro de la vejiga y causar hemorragia. Una medicina llamada Mesna se le recetará para ayudar a proteger la vejiga. Tambien recibirá líquidos por via intravenosa y le recordarán que tiene que orinar cada 2 a 3 horas.
- **Recuento globular bajo –** Esto es temporario y ocurre por lo general 10-14 días despues del tratamineto. Durante este tiempo, usted puede correr el riesgo de hemorragias o infecciones. Su doctor puede hacerle análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
- **Náusea y Vómito** – Se le dará medicina para ayudar a controlar y prevenir estos síntomas.
- **Pérdida de pelo temporaria –** Puede ocurrir 2-4 semanas después de tomar la droga.
- **Fatiga –** Puede ser que esta droga lo haga sentir soñoliento o cansado.
- **Infertilidad –** Despues de recibir esta droga, hombres y mujeres por lo general no pueden tener niños.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Náusea o vómito incontrolable; o si no puede comer o beber por 24 horas.
- Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la nariz; moretones raros
- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Si se siente confundido o desorientado en cualquier momento
- No tome productos que contienen aspirina

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque puede haber modificaciones de la esperma y los óvulos.
- **Beba más liquidos –** trate de beber por lo menos 8 vasos de líquidos al día mientras está tomando esta droga.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**