Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

**Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.**
**Para emergencias, llame al 911.**

# EDUCACION PARA PACIENTES

**L-Asparaginase (Elspar)**

## EFECTOS SECUNDARIOS

**Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:**

- **Reacciones alérgicas** – Pueden ocurrir y producir sarpullido, fiebre, escalofríos, o dificultad para respirar – MENCIONE ESTOS SINTOMAS A SU ENFERMERA.
- **Náusea y Vómito –** Puede ocurrir en 4-6 horas del tratamiento. Se le dará medicina para ayudar a controlar y prevenir estos síntomas.
- **Dolor de cabeza**
- **Fiebre** (100-101°F) Esto le ocurre a la mitad de los pacientes aproximadamente que reciben esta droga.
- **Pérdida de apetito**
- **Malestar generalizado** – Ocurre en la mayoría de los pacientes y por lo general se intensifica con cada dosis.
- **Sarpullido** – Puede ocurrir.
- **Músculos de los brazos adoloridos** – Puede ocurrir.
- **Problemas del hígado** – El recuento sanguíneo relacionado con la funión del hígado será observado regulamente.
- **Nivel de azúcar en la sangre elevado**
- **Somnolencia**

## RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

**Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:**

- Ronchitas o brazos adoloridos por más de un dia
- Sarpullido, falta de aliento, somnolencia, cara hinchada, o dolor en las coyunturas
- Náusea o vómito que persiste o si no puede comer o beber por 24 horas
- Ojos o piel amarillenta

## INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- Puede que le den una dosis de prueba antes de comenzar esta droga.
- Tenga cuidado al manejar porque puede sentirse somnoliento.
- Algunos pacientes tienen severas reacciones a esta droga que incluyen ronchitas, escalofríos, fiebre, enrojecimiento en la cara, presión arterial baja, y falta de aliento. Esto sucede poco tiempo después de tomar la droga. El doctor o enfermera estarán disponibles inmediatamente por 30 minutos después de que tome la droga para ayudarle con cualquier problema. Si tiene alguna de estas reacciones, NO TOME LA DROGA OTRA VEZ. Otra droga llamada Erwinia Asparaginase sirve cono alternativa para pacientes que son alérgicos a L-Asparaginase. Erwinia Asparaginase trabaja igual que L-Asparaginase.
- **NO SE VACUNE HASTA QUE LO APRUEBE EL DOCTOR.**