

EDUCACION PARA PACIENTES

Leustatin (Cladribine)

EFFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esto es temporal. Durante este tiempo, usted puede correr el riesgo de hemorragias o infecciones. Su doctor puede hacerle análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
- **Fiebre** – Esto ocurre por lo general durante el primer mes del tratamiento.
- **Sarpullido** – leve.
- **Náusea Leve** – Puede ocurrir. Puede ser que necesite medicina par ayudar a controlar y prevenir estos síntomas.
- **Fatiga** – Común.
- **Dolor de cabeza** – Ocasionalmente
- **Falta de apetito**
- **Reacción en el lugar donde recibió la inyección**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Ronchas que no tenía
- Si sangra en forma inesperada
- Náusea y vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas.
- Enrojecimiento, dolor, o hinchazón en donde le pusieron la inyección

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígame a su dentista que está tomando esta medicina.**