Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Lomustine (CCNU)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esta droga puede bajarle el número de glóbulos rojos y blancos. Durante este tiempo, usted puede correr el riesgo de hemorragias o infecciones. Se le harán análisis de sangre periódicamente para evaluar su recuento globular.
- **Náusea y Vómito –** Aproximadamente 4-5 horas despues de tomar la cápsula puede sentir náusea y vómito. Le ofrecerán medicina para ayudar a controlar y prevenir estos síntomas. Náusea y vómito pueden durar hasta 24 horas.
- **Falta de apetito**
- **Pérdida de pelo**
- **Herpes labiales**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la nariz; moretones raros
- Náusea y vómito que persisten o si no puede comer o beber en 24 horas.
- Falta de aliento, tos seca sin flema, respiración acelerada
- Si hay cambios en la cantidad de orina

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede poner en peligro la salud del esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- Es muy importante que tome esta droga **exactamente** como se la recetan
- La mejor hora de tomar esta medicina es antes de dormir para que le cause menos molestias estomacales.