Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Lupron (Leuprolide)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- Sofocos de calor – pueden variar en intensidad; pueden enrojecerse las mejillas o puede sudar. Esta molestia disminuye a medida que continúan los tratamientos.
- Aumento temporario de síntomas – Por las primers 2-3 semans después de su primera inyección puede sentir que los síntomas de la enfermedad se agravan – debilidad temporal de las piernas, dolor de huesos, dificultad al orinar. Esta condición debe disminuir en 14-21días después de la inyección.
- Cambios sexuales – deseo sexual disminuye; impotencia, reducción en el tamaño de los testículos.
- Aumento de peso
- Inflamación o dolor de los senos
- Hemorragia vaginal anormal – en caso de mujeres – dígale a su doctor si esto persiste
- Dolores de cabeza, vista desenfocada, mareos – Pueden ocurrir.
- Náusea
- Inflamación en donde le pusieron la inyección
- Estreñimiento – esto es más común en los hombres

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Cambios en el latido del corazón o latido del corazón irregular
- Falta de aliento, comezón, inflamación debida a retención de líquidos, picazón de garganta, mareos, hinchazón de la cara
- Dolor, enrojecimieto o inflamación donde le pusieron la inyección
- Náusea o vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas
- Cambios en su personalidad o en su conducta; depresión
- Estreñimiento que no se alivia con su rutina de laxantes
- Si no puede orinar
- Dolor de huesos que no mejoran con medicina para el dolor

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.