

**Si tiene alguna pregunta,
por favor consulte con su
medico o llame al Coastal
Cancer Care de AGCH
al 805.481.7245.**

Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Mitomycin-C (Mutamycin)

EFFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esto es temporal y puede ocurrir 4-5 semanas después de tomar esta droga. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarras, infecciones, y hemorragias. Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
- **Náusea y vómito** – Esto es por lo general leve por los primeros 1-3 días después de su tratamiento. Le darán medicina para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Falta de apetito**
- **Boca adolorida**
- **Orina de color grisáceo/azulado** – Por 24-48 horas después de recibir esta droga.
- **Debilidad y cansancio** – Muy común.
- **Cambio en las uñas** – Bandas moradas pueden aparecer en las uñas después de varias dosis.
- **Perdida de pelo** – Es temporaria y el pelo crece después del tratamiento.
- **Síntomas de gripe** – Puede sentirse como si tuviera la gripe por 2-3 días después de recibir la medicación. Los síntomas son dolor muscular, debilidad, falta de apetito, fatiga; estos síntomas son leves y puede mejorar con Tylenol.
- **Irritación de las venas donde recibe la inyección** – Esta medicina irrita la vena donde recibe la inyección. Si se derrama fuera de la vena, puede quemar o dañar los tejidos alrededor de esa área. Cuando reciba esta medicación se lo evaluará cuidadosamente.
- **Esterilidad**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Enrojecimiento, dolor, o ardor en donde recibe la inyección
- Náusea o vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas
- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpes hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la nariz; moretones raros.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede poner en peligro la salud del espermatozoides y óvulos.
- Si esta droga se derrama fuera de la vena, puede quemar o dañar los tejidos alrededor de esa área. **Reporte cualquier dolor o molestia en el lugar de la inyección a su doctor o enfermera INMEDIATAMENTE.**
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígame a su dentista que está tomando esta medicina**