Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Mitotane (Lysodren)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Náusea y vómito** – Puede tener esta molestia por pocos días despues del tratameinto. Le darán medicina para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Falta de apetito**
- **Diarrea**
- **Fatiga y somnolencia**
- **Mareos/vértigo**
- **Mareos**
- **Irritación de la piel/sarpullido**
- **Vista desenfocada**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncologia si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia; Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la nariz; moretones raros
- Náusea o vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas
- Diarrea incontrolable
- Sarpullido
- Aumento de fatiga o si se siente más somnoliento

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- **Se la darán 1 o 2 drogas adicionales para compensar por ciertos efectos causados por esta droga a la glándula adrenal. No debe de dejar de tomar estas drogas sin consultar antes a su médico.**