Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Mitoxantrone (Novantrone)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esto es temporario y puede ocurrir 10-14 días después de tomar esta droga. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
- **Náusea y vómito –** Es por lo general leve o moderado. Le darán medicina para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Boca adolorida –** Este malestar puede suceder en varias intensidades; algunas personas tienen ampollas o úlceras. Algunos tienen manchas blancas. Es importante que mantenga la higiene de su boca para prevenir infecciones. Use cepillos de dientes suaves. Nunca use elixires bucales comerciales que contengan alcohol. Su doctor puede recetarle medicina para ayudarle a aliviar la boca o para que se sienta mejor cuando coma. Coma comida suave, poco condimentada, y tibia.
- **Diarrea**
- **Pérdida de pelo** – Es temporaria y leve.
- **Coloración azul o verde de la orina o los ojos** – La orina puede ponerse verde por 24-48 horas; la parte blanca del ojo puede ponerse azul o verde por 24-48 horas después de recibir la droga.
- **Síntomas cardiacos –** Pueden ocurrir; tenga cuidado si nota que el corazón late rápidamente o si siente dolor en el pecho.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la nariz; moretones raros
- Dolor en el pecho, latido del corazón elevado, piernas hinchadas, o falta de aliento
- Náusea o vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 hora
- Enrojecimiento, dolor, o hinchazón en donde recibió la inyección

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede poner en peligro la salud del esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- Irritación en la área de la inyección – Si esta droga se derrama fuera de la vena, puede quemar o dañar los tejidos alrededor de esa area. Tiene que mencionar INMEDIATAMENTE cualquier dolor o quemazón en donde le ponen la inyección.