Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Neupogen (Filgrastim)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Dolor de huesos** – Esta molestia es por lo general leve o mederada. Esta molestia es por la estimulación de la médula ósea. El dolor puede empezar pocas horas o pocos días despues de recibir esta droga. Puede durar por pocas horas o días en el hueso del pecho, la parte baja de la espalda, caderas, y otros huesos largos. Su doctor puede darle medicina para aliviar este síntoma.
- **Fatiga** - Este síntoma acompaña a este tratamiento por lo general y es similar al de radiación o quimioterapia. Descanse a menudo.
- **Efectos en el lugar de la inyección** – Puede tener enrojecimiento e irritación en el lugar de la inyección. Por lo normal, esta droga se aplica debajo de la piel (en el tejido adiposo).
- **Sarpullido** – Puede ser que le salga sarpullido después de recibir esta droga. El sarpullido desaparece por sí mismo, pero puede decirle al doctor si le causa molestias.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Dolor de huesos que no se alivian con Tylenol
- Enrojecimiento, hinchazón, o picazón en el lugar de la inyección
- Sarpullido sobre todo el cuerpo, falta de aliento, respiración con silbidos, pulso acelerado, o sudor.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Tome esta medicina exactamente comes se la recetan y obtenga los análisis que le pide el médico.**