Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Nitrogen Mustard (Mechlorethamine, Mustargen)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esto es temporario y puede ocurrir 7-14 días después del tratamiento. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
- **Náusea y vómito** – Puede ser moderado o severo y empieza 1-3 horas después de recibir la droga y puede durar 1-2 días. Le darán medicina para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Diarrea** – Puede ser leve o moderada y puede durar 1-2 días después del tratamiento. Se puede controlar con medicina por lo general.
- **Cambios de apetito** – Frecuentemente, sabor metálico en la boca.
- **Cambios en el ciclo menstrual** – Puede que tenga irregularidades o que no tenga menstruación mientras tome esta droga. Esto no significa que no se puede embarazar.
- **Redución del esperma en los hombres**.
- **Irritación o daño en el lugar de la inyección** – Esta droga es MUY irritante a las venas y causará daño si se derrama fuera de la vena durante la inyección. Tiene que reportar cualquier dolor o quemazón a la enfermera INMEDIATAMENTE si sente esto cuando le ponen la inyección.
- **Efectos poco communes** – Raramente, pacientes que reciben esta droga sienten dolores de cabeza, mareos, debilidad, zumbido en los oídos, fiebre, piel y ojos amarillentos. Se la observará para evaluar si tiene estos síntomas.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Rojez, dolor, hinchazón en donde le ponen la inyección
- Náusea y vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas
- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la mariz; moretones raros
- Sarpullido o si la piel y ojos se ponen amarillos

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses despues del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- Si siente algun dolor o molestia en donde le ponen la inyección, dígale al doctor o enfermera INMEDIATAMENTE.
- Si donde le ponen la inyección está adolorido, póngase una toalla húmeda varias veces al día entre tratamientos. Esto le ayudará a disminuir la hinchazón y el dolor.