Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene algun
por favor con
medico o llam
Cancer Care
al 805.481.724
Para emerger

EDUCACION PARA PACIENTES

Tarceva (Erlotinib)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas méficas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Sarpullido**
- **Diarrea**
- **Disminución de apetito**
- **Fatiga**
- **Falta de aliento**
- **Tos**
- **Náusea y vómito**
- **Infección**
- **Herpes labiales**
- **Picazón**
- **Piel reseca**
- **Irritación en los ojos**
- **Dolor en el abdomen**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncologia inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Inicio o empeoramiento de dificultaes rspiratorias o tos inexplicables
- Náusea (interfiere con la habilidad de comer y no mejora con los medicamentos recetados)
- Vómito (mas de 4-5 veces en un período de 24 horas)
- Diarrea (mas de 4-6 episodios en un período de 24 horas)
- **F**atiga excesiva (le impide realizar su cuidado personal: aseo, vestido, peinado, etc.)
- Herpes labiales (dolor, enrojecimiento, hinchazón o úlceras)
- Irritación de los ojos
- Si no puede comer o beber por 24 horas o tiene síntomas de deshidratación: cansancio, sed, boca seca orina osucra, menos cantidad de orina o mareos.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos –** esta medicina debe ser recetada solamente a mujeres despues de pa menopausia.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**