Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Taxol (Paclitaxel)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esta droga puede bajarle el recuento globular temporalmente. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
- **Náusea y vómito –** Es común pero por lo general leve. Le darán medicina para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Dolor de huesos o músculos –** Puede ocurrir 3-5 días después del tratamiento. Se puede controlar con Tylenol.
- **Manos y pies dormidos o con sensación de hormigueo –** la sensasión aparece después de tomar varias dosis.
- **Perdida del pelo –** Por lo general se pierde completamente pero crece otra vez cuando acaba el tratamiento.
- **Reacciones alérgicas –** La enfermera se quedará con usted durante los primeros 15 minutos. Le checaran la tension y el pulso frequentemente durante este proceso. Dígale a la enfermera si siente comezón, picazón en la garganta, mareos, respiración con silbidos, etc.
- **Cambios en el corazón –** Esta medicina puede afectar el corazón asi que notifique a su doctor o enfermera si siente falta de aliento, pulso acelerado, pulso irregular, etc.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia; Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la mariz; moretones raros
- Manos y pies dormidos o sensación de hormigueo
- Cambios en el rítmo del corazón, falta de aliento, latido del corazón irregular.
- Cualquier cambio de sensación durante la administración de esta droga
- Náusea o vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- **Infórmele a su doctor si ha tenido problemas del corazón anteriormente.**