Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Thiotepa (Triethylenethiophosphoramide, TESPA, TPSA)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Náusea y vómito –** Por lo general es leve.
- **Falta de apetito**
- **Recuento globular bajo** – Esto es temporario y puede ocurrir 14 días después del tratamiento. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Tendrá análisis de sangre frecuentemente para evaluar su recuento globular.
- **Dolor en el lugar de la inyección** – Con inyecciones de IM. Rojez, hinchazón.
- **Cambios en el ciclo menstrual** – Puede que a veces no tenga la regla.
- **Mareos, dolor de cabeza** – Leves.
- **Alergias** – Sarpullido, ronchitas, opresión en la garganta.
- **Herpes labiales**
- **Pérdida de pelo** –Temporaria. Crece otra vez.
- **Cambios de la piel** – Ronchitas o sarpullido

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la nariz; moretones raros
- Náusea o vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas
- Falta de aliento respiración con silbidos, comezón, picazón o cosquillas en la garganta
- Cambios en el ciclo menstrual

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede poner en peligro la salud del esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- Puede ser que las areas donde ha recibido radiación previamente se sientan adoloridas.
- Si se siente mareado, acuéstese hasta que la sensasión pase.
- Tome más liquidos para aumentar la cantidad de orina.