Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Treanda (Bendamustine Hydrochloride)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo (los glóbulos blancos, rojos y plaquetas podrían bajar temporariamente. Incremento del riesgo para infecciones, anemia y/o hemorragias)**
- **Aumento en los niveles de la bilirrubina**
- **Reacciones a la infusión (escalofríos, fiebre, picazón, sarpullido)**
- **Fiebre**
- **Náusea**
- **Vómito**
- **Fatiga**
- **Diarrea**
- **Sarpullido**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F
- Náusea
- Vómito (mas de 4-5 veces en un período de 24 horas)
- Diarrea (mas de 4-6 episodios en un período de 24 horas)
- Cualquier moretón o hemorragia rara
- Sangre en el excremento o si está negro o muy obscuro
- Sangre en la orina
- Dolor o ardor al orinar
- Fatiga
- Sarpullido o comezón severos o que empeoran
- Piel y ojos amarillentos
- Si no puede comer o beber en 24 horas
- Deshidratación

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**