Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

**Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245**
**Para emergencias, llame al 911.**

# EDUCACION PARA PACIENTES

## Velcade

**Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente.**

- En caso de tener efectos secundarios, estos generalmente aparecerán 12 horas después del tratamiento.
- No todos los pacientes tendrán efectos secundarios. Los más frecuentes son diarrea, constipación, náusea o vómitos. Su doctor le recetará medicación para la náusea.
- Para diarrea le sugerimos que tome medicación anti-diarrea como Imodium AD que se compra sin receta.
- Para constipacion un laxativo/ablandador como Senokot S que se compra sin receta.
- Para náusea o vómitos ordenaremos una receta si es necesario.

## Efectos sobre la Capacidad de Manejar u Operar Maquinaria o Deterioro Mental

- Velcade puede ser responsable de fatiga, mareos
- Baja presión que ocurre después del tratamiento
- Problemas de la visión o visión borrosa
- PACIENTES DEBEN SER MUY PRUDENTES CUANDO OPERAN MAQUINARIAS, INCLUYENDO AUTOMÓBILES

## Embarazo/Crianza

Si usted está embarazada háblele a su doctor y notifiquele antes de comenzar el tratamiento con Velcade.

## Medicaciones Adicionales

Pacientes deben ser informados sobre el uso de otros medicamentos que puedan estar tomando y que pueden causar neuropatia periférica (como Amiodone, Antivirales, Isoniazida o Nitrofurantoína) o medicamentos que puedan bajar la presión arterial.

## Disminución de sensación en los dedos de las manos o pies (Neuropatía Periférica)

Pacientes deben ser instruidos en llamar a sus médicos si les aparecen síntomas nuevos o empeoran síntomas presentes de Neuropatia Periférica como por ejemplo hormigueo, entumecimiento de los dedos en las manos o pies.