Arroyo Grande Community Hospital
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al Coastal Cancer Care de AGCH al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Vinorelbine (Navelbine)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esto es temporal y puede ocurrir 1-2 semanas después de recibir esta droga. Durante este tiempo, uste estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
- **Estreñimiento** – Aumenta después de varios tratamientos.
- **Náusea y vómito –** Leve o moderado y empieza en 24 horas del tratamiento.
- **Fatiga y debilidad –** Empeora después de varios tratamientos.
- **Daño a los nervios –** Puede notar que los dedos de las manos y pies se le duermen, sensación de hormigueo, o falta de sensación.
- **Pérdida de pelo –** Puede que tenga pérdida de pelo leve o que pierda todo el pelo de la cabeza y el cuerpo. Esto es temporal y le crecerá cuando termine el tratamiento.
- **Falta de apetito o sabor metálico**
- **Fatiga**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Rojez, dolor, hinchazón en donde le ponen la inyección
- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la nariz; moretones raros
- Estreñimiento severo; dolor o inflamación abdominal
- Dififultad al orinar; dificultar al caminar o al agarrar objetos; dolor de cabeza o cambios en la visión
- Náusea o vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- Aumente la cantidad de fibra en su dieta y tome suficientes líquidos
- Tome laxantes come se los receten
- Esta droga puede dañar el tejido si se derrama fuera de la vena. **POR FAVOR DIGALE A SU ENFERMERA INMEDIATATMENTE SI TIENE DOLOR O PROBLEMA EN LA AREA DE LA INYECCIÓN.**
- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**